ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

ADJUSOL TMP SULFA πόσιμο διάλυμα

1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
VIRBAC S.A.
1ere Anevue –2065m.-L.I.D.
06516 Carros Cedex
France

Παραγωγός και υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:
VIRBAC S.A.
1ere Anevue –2065m.-L.I.D.
06516 Carros Cedex
France

2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ADJUSOL TMP SULFA πόσιμο διάλυμα.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

Ανά 100 ml:
Trimethoprim…….1,665 g
Sulfadiazine……8,335 g

Άλλες ουσίες:
30% διάλυμα sodium hydroxide (q.s. pH 10,25)…≈….4,5 g
Polyethylele glycol 200……..60 ml
Purified water……..έως…….100 ml

4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)

Λοιμώξεις των ορνιθίων που προκαλούνται από βακτήρια ευαίσθητα στο συνδυασμό σουλφαδιαζίνης – τριμεθοπρίμης και κυρίως από *E.coli*, *Salmonella* spp., *Pasteurella*, *Haemophilus*.

5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Να μη χορηγείται σε ορνίθια υπερευαίσθητα στις σουλφοναμίδες ή σε κάποια από τα συστατικά του προϊόντος.
Να μη χορηγείται σε ωοπαραγωγές όρνιθες.

6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Δεν παρατηρούνται εφόσον ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσεως.
Υπερδοσολογία των σουλφοναμίδων προκαλεί νέφρωση. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διακόπτεται η χορήγηση του προϊόντος.
Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικώς τον κτηνίατρό σας.

7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ
Ορνίθια κρεοπαραγωγής.

8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Χορήγηση από το στόμα με το πόσιμο νερό των ορνιθίων. Το προϊόν να διαλύεται στο νερό και να αναμειγνύεται πολύ καλά.
Χορηγούνται 50-60 mg συνδυασμού σουλφαδιαζίνης – τριμεθοπρίμης ανά kg σ.β. ανά ημέρα για 3-5 ημέρες ή 0,5-0,6 ml ADJUSOL TMP SULFA / kg σ.β. / ανά ημέρα για 3-5 ημέρες.
Όταν η ημερήσια κατανάλωση νερού είναι 200 ml / kg σ.β. αντιστοιχούν 2,5-3 ml ADJUSOL TMP SULFA ανά L πόσιμου νερού.
Η δόση πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με την πραγματική κατανάλωση νερού από τα ορνίθια και πάντα σύμφωνα με τη συνιστόμενη δοσολογία.

9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
Να μη συνδυάζεται το ADJUSOL TMP SULFA με ουσίες που απελευθερώνονται PABA (Paraaminobenzoic acid).
Οι σουλφοναμίδες επιτείνουν τη δράση των αντιπηκτικών παραγόντων.

10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ
Κρέας & εδώδιμοι ιστοί: 11 ημέρες

11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ
Φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό μέρος, προστατευμένο από την έκθεση στον ήλιο και το φως.
Διάρκεια ζωής μετά το πρώτο άνοιγμα του περιέκτη: 24 μήνες, εφόσον φυλάσσεται σε θερμοκρασία μεταξύ 15-25ºC.
Διάρκεια ζωής μετά από διάλυση στο νερό: 72 ώρες.
Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

12. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Να αποφεύγεται η απευθείας επαφή του διαλύματος με το δέρμα, τα μάτια και τους βλεννογόνους του ατόμου που χορηγεί το προϊόν στα ορνίθια. Σε περίπτωση επαφής να πλένονται τα προσβεβλημένα τμήματα με άφθονο νερό.
Να μη χορηγείται σε ορνίθια με νεφρική ανεπάρκεια.

13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
14-6-2005

15. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

VIRBAC HELLAS A.E.
23ΧΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565, ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ
Τηλ. 210 – 62 19520
Φαξ 210 – 81 40900
e-mail: info@virbac.gr