

**ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ****TERRAVET****1. ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΑΡΤΙΔΩΝ ΣΤΟΝ ΕΟΧ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ**

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός:

**VIRBAC S.A.**

Iere Avenue, 2065 m – L.I.D., FRANCE

Τηλ. 33 4 92 08 71 00, Fax. 33 4 92 08 71 65

E-Mail [contact@virbac.gr](mailto:contact@virbac.gr)

Παραγωγός υπεύθυνος για την απελευθέρωση των παρτίδων:

**VIRBAC S.A.**

Iere Avenue, 2065 m – L.I.D., FRANCE

Τηλ. 33 4 92 08 71 00, Fax. 33 4 92 08 71 65

E-Mail [contact@virbac.gr](mailto:contact@virbac.gr)

**2. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ  
TERRAVET****3. ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΟ(Α) ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ(Α) ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΟΥΣΙΕΣ**

**Δραστικό συστατικό:**

Ανά 100 g

Οξυτετρακυκλίνη .....20 g

**Έκδοχα:**

Calcium carbonate .....5 g

Wheat middlings q.s.....100 g

**4. ΕΝΔΕΙΞΗ(ΕΙΣ)**

Αναπνευστικές λοιμώξεις των χοίρων που οφείλονται σε βακτήρια ευαίσθητα στην οξυτετρακυκλίνη (κυρίως *Pasteurella multocida*, *Bordetella bronchiseptica*, *Actinobacillus pleuropneumoniae*).

**5. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ**

Να μη χορηγείται σε ζώα με υπερευαίσθησία στην οξυτετρακυκλίνη.

**6. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ**

Δεν αναφέρονται όταν χρησιμοποιείται το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.

Η οξυτετρακυκλίνη χορηγούμενη κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης εναποτίθεται στα οστά και τους οδόντες με αποτέλεσμα τη δυσχρωμία τους.

*Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε σοβαρή ή άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης, παρακαλείσθε να ενημερώσετε σχετικά τον κτηνίατρό σας.*

**7. ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ**

Χοίροι.

**8. ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΔΟΣ(ΟΙ) ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ**

Παρασκευή φαρμακούχου ζωοτροφής και χορήγηση από το στόμα. Το προϊόν να προστίθεται στην τροφή μετά από όλα τα άλλα συστατικά της. Χοίροι: 50 mg ανά kg σ.β. ανά ημέρα για 3-5 ημέρες. Ο ρυθμός της ενσωμάτωσης του προϊόντος στην τροφή θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με την πραγματική ημερήσια κατανάλωση τροφής κατ' αναλογία προς τη συνιστώμενη δοσολογία. π.χ. Αν η κατανάλωση τροφής είναι 1 kg από ζώο 20 kg, να χρησιμοποιείται ο ρυθμός ενσωμάτωσης του προϊόντος σε αναλογία 5 kg ανά τόνο τροφής.

#### **9. ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

Υπάρχει διασταυρούμενη αντίσταση με άλλες τετρακυκλίνες.

Να μη χρησιμοποιείται με βακτηριοκτόνο αντιβιοτικό.

Να μην προστίθεται σε τροφή που περιέχει σε μεγάλες ποσότητες ασβέστιο, μαγνήσιο ή χαλκό.

#### **10. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ**

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: 16 ημέρες

#### **11. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ**

Φυλάσσεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος στον αρχικό περιέκτη.

Να φυλάσσεται σε θέση, την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά

Διάρκεια ζωής του κτηνιατρικού φαρμακευτικού προϊόντος σύμφωνα με τη συσκευασία πώλησης:  
24 μήνες.

Διάρκεια ζωής μετά την ανάμειξη με την τροφή: 3 μήνες.

#### **12. ΕΙΔΙΚΗ(ΕΣ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ(ΕΙΣ)**

Καμία

#### **13. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΕΝΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΑΛΛΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Κάθε μη χρησιμοποιηθέν κτηνιατρικό φαρμακευτικό προϊόν ή μη χρησιμοποιηθέντα υπολείμματά του πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές απαιτήσεις.

#### **14. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ**

Λεπτομερείς πληροφορίες για τον παρόν προϊόν διατίθενται στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) στη διεύθυνση <http://www.emea.eu.int/>

#### **15. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**VIRBAC HELLAS A.E.**

23ΧΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΜΙΑΣ, 14565

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ

Τηλ. 210 – 62 19520

Φαξ 210 – 81 40900

e-mail: info@virbac.gr

www.virbac.gr